

# پایداری مجانبی اپراتورهای فوق کروی<sup>۱</sup>

غلامرضا شهریار حشمتی

استادیار گروه علوم پایه مهندسی - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت ۸۱/۷/۱۰، تاریخ تصویب ۸۱/۱۱/۱۵)

## چکیده

اپراتورهای فوق کروی برای اندازه  $d\mu_\alpha(x) = (1-x^2)^\alpha dx$  تشکیل یک سیستم متعامد بر بازه  $[-1,1]$  می دهند. برای  $\alpha > -\frac{1}{4}$ ، فرمول ضرب گنبنائز<sup>۲</sup> نشان می دهد که هسته گنبنائز تصادفی است.

در این مقاله با در نظر گرفتن این هسته یک اپراتور مارکف  $P_{\alpha x}$  تعریف می شود و با استفاده از خواص اپراتورهای مارکف پایداری مجانبی آن به ازای  $-\frac{1}{4} \leq \alpha \leq 0$  ثابت می گردد. سپس این نتیجه با استفاده از تکنیک های آنالیز هارمونیک<sup>۴</sup> برای  $\alpha \geq -\frac{1}{4}$  تعمیم می یابد.

**واژه های کلیدی:** اپراتورهای مارکف، پایداری مجانبی، چند جمله ای های فوق کروی، هسته گنبنائز

## مقدمه

اولین بار آنالیز هارمونیک در مورد چند جمله ای های فوق کروی توسط هیرشمن<sup>۵</sup> [۴] بررسی شد. بسیاری دیگر از خواص این چند جمله ای ها توسط گاسپر<sup>۶</sup> [۳،۲] به اثبات رسیده است. در مورد پایداری مجانبی اپراتورهای مارکف می توان به [۷] رجوع کرد.

فرض کنیم  $(\Omega, A, \mu)$  یک فضای اندازه و  $D = \{f \in L^1(\Omega, d\mu) \mid f \geq 0, \|f\|_1 = 1\}$  فضای چگالی های آن باشد. هر اپراتور خطی  $P: L^1 \rightarrow L^1$  که در دو شرط زیر صدق کند یک اپراتور مارکف نامیده می شود.

(الف)  $Pf \geq 0$  برای هر  $f \in L^1$  و  $f \geq 0$

(ب)  $\|Pf\|_1 = \|f\|_1$  برای هر  $f \in L^1$  و  $f \geq 0$

اگر  $P$  یک اپراتور مارکف باشد،  $\{P^m\}$  بطور مجانبی پایدار نامیده می شود هرگاه یک چگالی  $f^* \in D$  وجود داشته باشد به طوری که  $Pf^* = f^*$

(۱)  $\lim_{m \rightarrow \infty} \|P^m f - f^*\|_1 = 0$  برای هر  $f \in D$

هر هسته تصادفی  $K^V$ ، یعنی هر تابع اندازه پذیر

$k: \Omega \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  که در دو شرط زیر

$$k(x,y) \geq 0$$

$$\int_{\Omega} k(x,y) d\mu(x) = 1$$

صدق کند، با رابطه

$$Pf(x) = \int_{\Omega} k(x,y)f(y)d\mu(y), f \in L^1$$

یک اپراتور انتگرال تعریف می کند که یک اپراتور مارکف است (به [۶] یا [۷] رجوع شود).

در [۷] یک شرط کافی برای پایداری مجانبی  $\{P^m\}$  بصورت زیر بیان شده است:

لم<sup>۱</sup> فرض کنیم  $P$  یک اپراتور مارکف و  $k_m: \Omega \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$

هسته تصادفی متناظر با  $P^m$  باشد، در این صورت، شرط

$$\int_{\Omega} \inf_{y \in \Omega} k_m(x,y) d\mu(x) > 0 \quad (۲)$$

پایداری مجانبی  $\{P^m\}$  را نتیجه می دهد.

در این مقاله، با در نظر گرفتن هسته گنبنائز یک اپراتور مارکف بصورت زیر تعریف می کنیم. فرض کنیم

$$Q_n^\alpha(x) = \frac{(-1)^n}{2^n(\alpha+1)\dots(\alpha+n)}$$

$$(1-x^2)^{-\alpha} \frac{d^n}{dx^n} (1-x^2)^{\alpha+n}$$

چند جمله ای فوق کروی<sup>۹</sup> از مرتبه  $n$  و با اندیس  $\alpha > -1$  باشد،

لازم به ذکر است که این چند جمله ای ها به ازای  $\alpha = -\frac{1}{4}$  چند

جمله ای های چیبیچف<sup>۱۰</sup> نوع اول:

$$G_{\alpha}(x,y,z) = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\alpha+\frac{1}{2})} \frac{(1-x^2-y^2-z^2+2xyz)^{\alpha-\frac{1}{2}}}{(1-x^2)^{\alpha}(1-y^2)^{\alpha}(1-z^2)^{\alpha}}$$

که در آن  $f_+$  قسمت مثبت  $f$  تابع  $f$  است. بنابراین

$$G_{\alpha}(x,y,z) \geq 0$$

با قرار دادن  $n = 0$  در رابطه (۸) و استفاده از رابطه (۴) و تقارن  $G_{\alpha}$  نسبت به  $x, y, z$  بدست می‌آید.

$$\int_{-1}^1 G_{\alpha}(x,y,z) d\mu_{\alpha}(y) = 1$$

که نشان می‌دهد که  $G_{\alpha}$  یک هسته تصادفی است.

بنابراین می‌توان اپراتور مارکف وابسته به  $G_{\alpha}$  را که اپراتور فوق‌کروی نام دارد به صورت زیر تعریف کرد:

$$[P_{\alpha,x} f](y) =$$

$$\int_{-1}^1 G_{\alpha}(x,y,z) f(z) d\mu_{\alpha}(z)$$

$$\forall f \in L^1(I, d\mu_{\alpha})$$

تقارن  $G_{\alpha}$  نسبت به  $x, y, z$  نتیجه می‌دهد.

$$[P_{\alpha,x} f](y) = [P_{\alpha,y} f](x)$$

و

$$\langle P_{\alpha,x} f, g \rangle = \langle f, P_{\alpha,y} g \rangle$$

(۹)

رابطه اخیر نشان می‌دهد که  $P_{\alpha,x}$  در  $L^1(d\mu_{\alpha})$  یک اپراتور خودالحاقی است. هدف اصلی این مقاله، اثبات قضیه زیر است.

### قضیه ۱

برای هر  $\alpha > -\frac{1}{2}$  و هر  $|x| < 1$ ،  $\{P_{\alpha,x}^m\}$  بطور مجانبی پایدار است و چگالی حدی آن برابر است با  $\omega_{\alpha}^1$  که در آن  $1$  تابع ثابت  $1(x) = 1$  می‌باشد.

ابتدا با استفاده از لم ۱ این قضیه را به ازای  $\alpha \in [0, \frac{1}{2}]$  ثابت کرده و سپس با استفاده از یک حاصلضرب تعمیم یافته در  $L^1(d\mu_{\alpha})$  و جبر  $A_{\alpha}$  قضیه را برای هر  $\alpha > -\frac{1}{2}$  تعمیم می‌دهیم.

با

$$Q_n^{-\frac{1}{2}}(\cos\theta) = \cos n\theta$$

به ازای  $\alpha = 0$ ، چند جمله‌های لژاندر<sup>[۱]</sup>

$$Q_n^{\circ}(x) = P_n(x)$$

و به ازای  $\alpha = \frac{1}{2}$ ، چند جمله‌ای های چبیچف نوع دوم می‌باشند.

$$Q_n^{\frac{1}{2}}(\cos\theta) = \frac{\sin(n+1)\theta}{(n+1)\sin\theta}$$

این چند جمله‌ای‌ها روی بازه  $I = (-1, 1)$  و برای اندازه  $d\mu_{\alpha}(x) = (1-x^2)^{\alpha} dx$  با رابطه

$$\int_{-1}^1 Q_m^{\alpha}(x) Q_n^{\alpha}(x) d\mu_{\alpha}(x) =$$

$$\begin{cases} 0, & n \neq m \\ (\omega_n^{\alpha})^{-1}, & n = m \end{cases}$$

که در آن

$$\omega_n^{\alpha} = \frac{(\gamma n + \gamma \alpha + 1) \Gamma(n + \gamma \alpha + 1)}{\gamma^{2\alpha+1} \Gamma(\alpha + 1) \Gamma(n + 1)}$$

یک دستگاه متعامد تشکیل می‌دهند (به [۱] رجوع شود).

این چند جمله‌ای‌ها دارای خواص زیراند [۱].

$$Q_n^{\alpha}(1) = 1$$

(۳)

$$Q_0^{\alpha}(x) = 1, Q_1^{\alpha}(x) = x$$

(۴)

$$Q_n^{\alpha}(-x) = (-1)^n Q_n^{\alpha}(x)$$

(۵)

$$|Q_n^{\alpha}(x)| < 1 \text{ اگر } \alpha > -\frac{1}{2}, |x| < 1 \text{ و } n \geq 1$$

(۶)

$$(n \geq 1) Q_1^{\alpha}(x) Q_n^{\alpha}(x) = \frac{n}{\gamma n + \gamma \alpha + 1} Q_{n-1}^{\alpha}(x)$$

$$+ \frac{n + \gamma \alpha + 1}{\gamma n + \gamma \alpha + 1} Q_{n+1}^{\alpha}(x)$$

(۷)

برای  $\alpha > -\frac{1}{2}$ ، فرمول گگنباثر برقرار است [۲]، [۳].

$$(-1 < x, y < 1) Q_n^{\alpha}(x) Q_n^{\alpha}(y) =$$

$$\int_{-1}^1 G_{\alpha}(x,y,z) Q_n^{\alpha}(z) d\mu_{\alpha}(z)$$

(۸)

**اثبات قضیه ۱ به ازای  $0 \leq \alpha \leq \frac{1}{4}$**

فرض کنیم  $X_{x,y} \subset (-1, 1)$  تکیه گاه مثبت  $^{13}$  تابع  $z \rightarrow 1 - x^2 - y^2 - z^2 + 2xyz$  باشد، یعنی،

$$\int_{X_{x,y}} G_{\alpha}(x,y,z) d\mu_{\alpha}(z) = \int_{-1}^1 G_{\alpha}(x,y,z) d\mu_{\alpha}(z)$$

واضح است که برای هر  $x$  و  $y$  در  $(-1, 1)$ ،  $X_{x,y}$  دارای اندازه مثبت است و  $z \in X_{x,y}$  برای هر  $\alpha \in [0, \frac{1}{4}]$  بنابرین  $(1 - x^2 - y^2 - z^2 + 2xyz)^{\alpha - \frac{1}{2}} \geq 1$

$$\inf \{ G_{\alpha}(x,y,z) \mid 1 - x < y < 1, z \in X_{x,y} \} \geq$$

$$\frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\alpha + \frac{1}{4})}, \forall \alpha \in [0, \frac{1}{4}]$$

رابطه اخیر نشان می دهد که لم ۱ به ازای  $m = 1$  برقرار است و در نتیجه  $\{P_{\alpha,x}\}$  به ازای  $0 \leq \alpha \leq \frac{1}{4}$  بطور مجانبی پایدار می باشد.

**حاصلضرب کانولوشن تعمیم یافته  $^{14}$  در  $L^1(d\mu_{\alpha})$  و جبر  $A_{\alpha}$**

برای هر  $f$  و  $g$  در  $L^1(d\mu_{\alpha})$ ، حاصلضرب کانولوشن تعمیم یافته  $f$  و  $g$  با رابطه زیر تعریف می شود.

$$(f * g)(x) = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 G_{\alpha}(x,y,z) f(y) g(z) d\mu_{\alpha}(y) d\mu_{\alpha}(z) =$$

$$\langle \bar{f}, P_{\alpha,x} g \rangle$$

$$\langle \bar{f}, P_{\alpha,x} g \rangle$$

شایان ذکر است که این حاصلضرب برای هر  $\alpha \geq -\frac{1}{4}$  یک حاصلضرب متمایزی است. لم های زیر نشان می دهند که این حاصلضرب دارای شباهت زیادی با حاصلضرب کانولوشن معمولی فضای  $L^1$  است. در ادامه، نرم  $f \in L^p(d\mu_{\alpha})$  را با

$$\|f\|_p = \left[ \int_{-1}^1 |f(x)|^p d\mu_{\alpha}(x) \right]^{\frac{1}{p}}$$

تعریف می کنیم:

لم ۲  $([2], [3])$ .

الف)  $L^1(d\mu_{\alpha})$  با حاصلضرب  $*$  یک جبر باناخ  $^{15}$  جابجائی نیمه ساده  $^{16}$  است.

ب) فرض کنیم  $1 \leq p, q, r \leq \infty$  و  $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$ ، اگر

$f \in L^p(d\mu_{\alpha})$  و  $g \in L^q(d\mu_{\alpha})$ ، آن گاه  $f * g \in L^r(d\mu_{\alpha})$  داریم:

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

برای هر  $f \in L^1(d\mu_{\alpha})$ ، ضریب فوریه تعمیم یافته  $f$  را با رابطه

$$\hat{f}(n) = \omega_n^{\alpha} \int_{-1}^1 f Q_n^{\alpha} d\mu_{\alpha}$$

تعریف می کنیم.

لم ۳. برای هر  $f, g \in L^1(d\mu_{\alpha})$  داریم

$$\widehat{f * g}(n) = (\omega_n^{\alpha})^{-1} \hat{f}(n) \hat{g}(n)$$

**اثبات**

این لم از رابطه

$$\widehat{f * g}(n) = \omega_n^{\alpha} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(x) g(y) d\mu_{\alpha}(x)$$

$$d\mu_{\alpha}(y) \int_{-1}^1 G_{\alpha}(x,y,z) Q_n^{\alpha}(z) d\mu_{\alpha}(z)$$

و رابطه (۸) نتیجه می شود.

حال فرض کنیم  $A_{\alpha}$  جبر توابع  $f$  پیوسته روی بازه

$I$ ، به صورت

$$f = \sum_{n \geq 0} \hat{f}(n) Q_n^{\alpha}$$

باشد به طوری که  $\sum_{n \geq 0} |\hat{f}(n)| < \infty$

لم ۴.  $A_{\alpha}$  با نرم  $\|\cdot\|_{\alpha}$  برای حاصلضرب ساده توابع یک جبر باناخ جابجائی است.

**اثبات**

کافی است ثابت کنیم

$$\|fg\|_{\alpha} \leq \|f\|_{\alpha} \|g\|_{\alpha}.$$

(۱۰)

رابطه (۷) را می توان به صورت زیر

$$Q_m^\alpha Q_n^\alpha = \sum_r h_{m,n,r}^\alpha Q_r^\alpha \tag{۱۱}$$

نوشت که در آن  $r$  روی مجموعه اعداد طبیعی به طوری که  $h_{m,n,r}^\alpha \neq 0$  یعنی روی مجموعه اعداد طبیعی  $|n-m| \leq r \leq n+m$  و  $m+n+r$  زوج تغییر می کند.

با محاسبه (۱۱) در نقطه  $x=1$  بدست می آید:

$$\sum_r h_{n,m,r}^\alpha = 1 \tag{۱۲}$$

بنابراین اگر  $\hat{f} = \sum_{n \geq 0} \hat{f}(n) Q_n^\alpha$  و  $g = \sum_{n \geq 0} \hat{g}(n) Q_n^\alpha$  با استفاده از روابط تعامد بین  $Q_k^\alpha$  و  $Q_r^\alpha$  بدست می آید.

$$\begin{aligned} \hat{f}g(k) &= \omega_k^\alpha \int_I \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} \hat{f}(n) Q_n^\alpha(x) \hat{g}(m) Q_m^\alpha(x) Q_k^\alpha(x) d\mu_\alpha(x) \\ &= \omega_k^\alpha \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} \hat{f}(n) \hat{g}(m) \int_I \sum_r h_{n,m,r}^\alpha Q_r^\alpha(x) Q_k^\alpha(x) d\mu_\alpha(x) \\ &= \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} h_{n,m,k}^\alpha \hat{f}(n) \hat{g}(m) \end{aligned}$$

بالاخره با استفاده از رابطه (۱۲) داریم:

$$\begin{aligned} \|fg\|_\alpha &= \sum_{k \geq 0} |\hat{f}g(k)| = \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} |\hat{f}(n) \hat{g}(m) (\sum_{k \geq 0} h_{n,m,k}^\alpha)| \\ &\leq (\sum_{n \geq 0} |\hat{f}(n)|) (\sum_{m \geq 0} |\hat{g}(m)|) \end{aligned}$$

که رابطه (۱۰) را نتیجه می دهد. از لم زیر در ادامه استفاده می شود.

لم ۵. برای هر  $f \in A_\alpha$ ، توابع  $g, h \in L^1(d\mu_\alpha)$  وجود دارند به طوری که  $f = g^*h$  و به طوری که

$$\|f\|_\alpha = \|g\|_2 = \|h\|_2 \tag{۱۳}$$

برعکس اگر  $g, h \in L^1(d\mu_\alpha)$  آنگاه  $g^*h \in A_\alpha$  و

$$\|g^*h\|_\alpha \leq \|g\|_2 \|h\|_2 \tag{۱۴}$$

### اثبات

برای هر  $f \in A_\alpha$ ، تعریف می کنیم  $\hat{g}(n) = \sqrt{\omega_n^\alpha} |\hat{f}(n)|$

$$\hat{h}(n) = \begin{cases} 0, & \hat{f}(n) = 0 \\ \frac{\hat{f}(n)}{\sqrt{|\hat{f}(n)|}}, & \hat{f}(n) \neq 0 \end{cases}$$

$$h = \sum_{n \geq 0} \hat{h}(n) Q_n^\alpha \text{ و } g = \sum_{n \geq 0} \hat{g}(n) Q_n^\alpha$$

طبق لم ۳،

$$g^*h(n) =$$

$$(\omega_n^\alpha)^{-1} \hat{g}(n) \hat{h}(n) = \hat{f}(n)$$

چون  $\{\sqrt{\omega_n^\alpha} Q_n^\alpha\}_{n \geq 0}$  یک دستگاه متعامد کامل یک  $l^2$  در  $L^2(d\mu_\alpha)$  است و  $\sum_{n \geq 0} |\hat{f}(n)| < \infty$ ، بدست می آید  $f = g^*h$  و رابطه (۱۳) نیز از فرمول پارمول سوال ۱۸ نتیجه می شود.

برعکس اگر  $g, h \in L^1(d\mu_\alpha)$ ، با استفاده از نامساوی کشی - شوارتز، داریم

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq 0} |g^*h(n)| &= \sum_{n \geq 0} \frac{1}{\omega_n^\alpha} \hat{g}(n) \hat{h}(n) \\ &\leq (\sum_{n \geq 0} \frac{1}{\omega_n^\alpha} \hat{g}(n)^2)^{\frac{1}{2}} (\sum_{n \geq 0} \frac{1}{\omega_n^\alpha} |\hat{h}(n)|^2)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

که رابطه (۱۴) را نتیجه می دهد.

لم ۶. آنژکسیون  $A_\alpha$  در  $L^1(d\mu_\alpha)$  پیوسته است و برای هر  $p$  ( $1 \leq p < \infty$ )،  $A_\alpha$  در  $L^p(d\mu_\alpha)$  چگال می باشد.

### اثبات

فرض کنیم  $f = \sum_{n \geq 0} a_n Q_n^\alpha$  با  $\sum_{n \geq 0} |a_n| < \infty$ ، چون  $|Q_n^\alpha(x)| \leq 1$  ازای هر  $x$ ، داریم

طبق فرمول (۸) برای  $f \in D$  داریم،

$$[P_{\alpha,x}^m f](y) = \sum_{n \geq 0} Q_n^\alpha(x)^m Q_n^\alpha(y) \hat{f}(n)$$

ولی برای  $f \in D$ ،

$$\hat{f}(0) = \omega_\alpha^{-1} \int_I f d\mu_\alpha = \omega_\alpha^{-1}$$

بنابراین، طبق روابط (۱۴) و (۱۵)،

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|P_{\alpha,x}^m f - \omega_\alpha^{-1}\|_1 \leq$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (\omega_\alpha^{-1})^{-1} \sum_{n \geq 1} |Q_n^\alpha(x)|^m |\hat{f}(n)| = 0$$

در اینجا جای حد و سیگما را با استفاده از همگرایی مسلط<sup>۲۱</sup> عوض کرده و از شرط آنکه به ازای هر  $x \in I$ ،  $\lim_{m \rightarrow \infty} |Q_n^\alpha(x)|^m = 0$  استفاده نموده ایم.

### نتیجه گیری

پایداری مجانبی اپراتور فوق کروی که یک اپراتور مارکف می باشد به اثبات رسید.

### تقدیر و تشکر

این مقاله تحقیقی، مستخرج از طرح پژوهشی ۶۱۱/۳/۶۹۴ با پشتیبانی مالی و معنوی دانشکده فنی دانشگاه تهران میسر گردید. لازم می دانم از دانشگاه تهران و دانشکده فنی بخاطر پشتیبانی بی دریغشان از امر پژوهش تشکر نمایم.

$$\|f\|_1 \leq \sum_{n \geq 0} |a_n| \int_T |Q_n^\alpha(x)| d\mu_\alpha(x) \leq$$

$$\frac{1}{\omega_\alpha} \sum_{n \geq 0} |a_n| = \frac{1}{\omega_\alpha} \|f\|_\alpha \quad (۱۵)$$

چگالی  $A_\alpha$  در  $L^p(d\mu_\alpha)$  از  $C^\infty(I) \subset A_\alpha$  نتیجه می شود. لم ۷. اپراتور فوق کروی  $P_{\alpha,x}$  جبر  $A_\alpha$  را در خودش می نگارد و یک انقباض<sup>۲۰</sup> این جبر است.

### اثبات

از فرمول (۸) داریم:

$$P_{\alpha,x} \hat{f}(n) = \omega_\alpha^{-1} \int_I \left( \int_I G_\alpha(x,y,z) \right.$$

$$\left. f(z) d\mu_\alpha(z) \right) Q_n^\alpha(y) d\mu_\alpha(y)$$

$$= \omega_\alpha^{-1} \int_I Q_n^\alpha(x) Q_n^\alpha(z) f(z) d\mu_\alpha(z) = Q_n^\alpha(x) \hat{f}(n)$$

بنابراین، طبق رابطه (۶)،

$$\|P_{\alpha,x} f\|_\alpha = \sum_{n \geq 0} |P_{\alpha,x} \hat{f}(n)| =$$

$$\sum_{n \geq 0} |Q_n^\alpha(x) \hat{f}(n)| \leq \sum_{n \geq 0} |\hat{f}(n)| = \|f\|_\alpha$$

### اثبات قضیه ۱

فرض کنیم  $D_\alpha = D \cap A_\alpha$ ، چون طبق لم ۶،  $A_\alpha$  در  $L^1(d\mu_\alpha)$  چگال است،  $D_\alpha$  نیز در  $D$  چگال است. به علاوه چون  $P_{\alpha,x}$  یک اپراتور مارکف و بنابراین یک انقباض  $L^1$  است، کافی است شرط (۱) را برای تنها  $f \in D$  بررسی کنیم.

### مراجع

- 1 - Erdelyi, A. (1953). *Higher transcendental functions*, Vol. 1, MacGraw Hill, New York.
- 2 - Gasper, G. (1971). "Positivity and the convolution structure for Jacobi series." *Ann. Math.*, 93, PP. 112-118.
- 3 - Gasper, G. (1972). "Banach algebras for Jacobi series and positivity of a kernel." *Ann. Math.*, 95 PP. 261-280.
- 4 - Hirschman, Jr., I. I. (1956). "Harmonic analysis and the ultraspherical polynomials." *Symposium of the Conference on Harmonic Analysis (Cornell)*.
- 5 - Hirschman, Jr. (1956). *Sur les polynomes ultraspheriques*, C. R. Acad. Sci., Paris 242, PP. 2212-2214.
- 6 - Lasota, A. and Mackey, M. (1958). *Probabilistic properties of deterministic systems*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, London.

- 7 - Lasota, A. and Mackey, M. (1994). *Chaos, fractals and noise, stochastic aspects of dynamics*, Springer Verlag, Berlin, New York.
- 8 - Meyer-Nieberg, P. (1991). *Banach lattices*, Springer Verlag, New York, Berlin.
- 9 - Schaefer, H. (1974). *Banach lattices and positive operators*, Springer Verlag, New York Berlin.

### واژه‌های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن

- 1 - Ultraspherical Operators
- 2 - Gegenbauer
- 3 - Markov
- 4 - Harmonic Analysis
- 5 - Hirschman
- 6 - Gasper
- 7 - Stochastic Kernel
- 8 - Lemma
- 9 - Ultraspherical Polynomial
- 10 - Tchebichef
- 11 - Legendre
- 12 - Positive Part
- 13 - Positive Support
- 14 - Generalized Convolution Product
- 15 - Banach
- 16 - Semisimple
- 17 - Complete Orthonormal System
- 18 - Parseral
- 19 - Injection
- 20 - Contraction
- 21 - Dominated Convergence